

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-5-70 085001

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN n° 116 de MAI 1970

13 mai 1970/ n° 12

V I G N E

INFORMATION.-

Brenner ou Rougeot parasitaire : Ce champignon attaque très tôt en saison. Dans ces conditions appliquer dès le stade 2-3 feuilles étalées un traitement mettant en oeuvre un des produits utilisés contre le mildiou. Cette information intéresse plus particulièrement les vignobles de la région de Chatillon-sur-Marne, de l'Aisne et du Barséquanais où le parasite est généralement actif.

Il serait vain de vouloir protéger les organes végétatifs si l'on favorisait par ailleurs la diffusion du parasite par un travail intempestif du sol. En effet un labour exécuté sur terre trop humide favorise la dissémination des spores issues des oeufs d'hiver enfouis avec les feuilles. Il faut donc s'abstenir de tout travail du sol tant qu'il n'est pas complètement ressuyé, cette pratique étant également déconseillée tant qu'il y a des risques de gelées.

ARBORICULTURE FRUITIERE

AVERTISSEMENT.-

Tavelures du pommier et du poirier : Par suite des pluies importantes du 11 mai et du lessivage du dernier traitement qui en est résulté, il est recommandé de renouveler le plus rapidement possible la protection anti-tavelure des arbres.

En fonction de l'importance des pluies intervenir sans attendre un nouvel avis de la station.

INFORMATIONS.-

Monilia des cerisiers : Une nouvelle protection s'impose le plus rapidement possible sur toutes les variétés de cerises.

Araignées rouges : (*Panonychus ulmi*) : ne pas intervenir actuellement, un examen attentif du niveau des populations devant être fait prochainement dans les vergers contaminés.

Oïdium : Réaliser un traitement mixte et supprimer par la taille les bouquets foliaires contaminés.

.../...

GRANDE CULTURE

INFORMATIONS.-

Charançon des siliques sur colza d'hiver :

Les populations évoluent lentement et la proportion des femelles aptes à pondre augmente.

Il est conseillé de réaliser un traitement pendant la période du 16 au 20 mai.

Par rapport à cette période observer un décalage de 2-3 jours en fonction des cultures les plus précoces (Sud de l'Aube) ou plus tardives (Ardennes-Hte-Marne).

Il est rappelé que sur colzas en pleine floraison il ne peut être mis en oeuvre que des produits reconnus non dangereux pour les abeilles.

Pégomyie de la betterave :

Les premiers oeufs s'observent depuis quelques jours sur betteraves cotylédonaire. Il n'y a pas à envisager de lutte actuellement.

Les Contrôleurs chargé des
Avertissements Agricoles,

R. PARIS

H. de MEIRLEIRE

A. GODIN

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire "CHAMPAGNE"

J. DELATRE.